RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

APO-TERBINAFINE

Comprimés de chlorhydrate de terbinafine

Prendre APO-TERBINAFINE une fois par jour, de préférence toujours à la même heure.

AU SUJET DE VOTRE MÉDICAMENT

APO-TERBINAFINE sert à traiter les infections fongiques de la peau et des ongles des orteils et de la main. Il est important de suivre à la lettre les directives de votre médecin. Des signes et des symptômes d'infection peuvent subsister à la fin du traitement. Ceux-ci diminueront progressivernent.

Si vous vous interrogez au sujet de l'information contenue dans le présent feuillet ou si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur votre médicament et sur son mode d'emploi, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Comme tous les autres médicaments, gardez APO-TERBINAFINE hors de la portée des enfants et ne laissez personne d'autre s'en servir.

AVANT D'UTILISER VOTRE MÉDICAMENT

Discutez avec votre médecin des effets secondaires possibles d'APO-TERBINAFINE.

Mentionnez à votre médecin si:

- vous êtes allergique à des médicaments vendus ou non sur ordonnance, ou à certains aliments;
- vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir durant votre traitement;
- vous allaitez; APO-TERBINAFINE passe dans le lait maternel;
- vous prenez d'autres médicaments vendus ou non sur ordonnance, notamment la cimétidine ou la rifampicine;
- vous avez déjà été aux prises avec d'autres troubles médicaux, notamment: troubles hépatiques tels qu'une jaunisse (coloration jaune de la peau ou des yeux), troubles rénaux, abus d'alcool, reactions cutanées graves ou troubles sanguins tels que l'anémie.

UTILISATION JUDICIEUSE DU MÉDICAMENT

Pour enrayer complètement l'infection dont vous êtes atteint, il est très important que vous preniez ce médicament pendant la durée de traitement prescrite, même si vos symptômes commencent à disparaître ou que vous vous sentiez mieux après quelques jours. Comme les infections fongiques peuvent mettre beaucoup de temps à disparaître, l'arrêt prématuré de la prise du médicament risque d'entraîner la réapparition des symptômes et de l'infection. Essayez de ne pas oublier de dose. S'il vous arrivait d'en oublier une, prenez-la des que vous y pensez, à moins que l'heure de la dose suivante soit très proche. Dans ce cas, ne tenez pas compte de Get oubli et revenez à votre horaire habituel. Ne prenez jamais une double dose et ne modifiez jamais vous-même la posologie. Prenez votre médicament tel qu'il vous a été prescrit.

- Respectez tous vos rendez-vous chez le médecin.
- Si vous croyez avoir pris une dose excessive de médicament, consultez votre médecin.
- Conservez ce médicament entre 15 et 30^{0}C. Gardez les comprimés à l'abri de a lumière.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Certaines personnes très sensibles à APO-TERBINAFINE ou ayant déjà souffert de troubles du foie risquent de presenter une fonction hépatique anormale si elles prennent ce médicament. Si vous constatez l'apparition d'une jaunisse (coloration jaune de la peau ou des yeux), cessez de prendre APO-TERBINAFINE et consultez immédiatement votre médecin.

Il arrive qu'en de rares occasions certains patients présentent des anomalies sanguines durant leur traitement par APO-TERBINAFINE. En général, ces reactions disparaissent spontanément apres l'arrêt du traitement.

Si vous avez des questions à ce sujet, consultez votre médecin.

Observez toujours les directives de votre médecin et assurez-vous de passer tous les tests qu'il vous prescrit. Aussi, présentez-vous à toutes les visites de suivi.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES D'APO-TERBINAFINE

Informez votre médecin si vous observez l'un ou l'autre des effets secondaires suivants:

	SIGNES ET SYMPTOMES	**MESURES A PRENDRE**
COURANTS	Symptômes gastro-intestinaux (diarrhèe, crampes, nausèes, vomissements, sensation de plènitude gastrique ou ballonnements).	Ces effets secondaires peuvent disparaître en cours de traitements. Toutefois, e'ils persistent ou s'ils vous incommodent, consultez votre mèdecin
MOINS COURANTS	Sècheresse de la bouche, perturbations gustatives, fatigue, manque de concentration, èruptions cutanées sans gravitè (rougeurs, prurit), cèphalèes, douleurs (dos, genoux, jambes, pieds, reins)	Vous devez signaler ces effets secondaires à votre mèdecin **le plus tôt possible**.
RARES ET GRAVES	Éruptions cutanèes graves, urticaire. * Maux de gorge et fièvre, jaunisse (peau ou yeux jaunes), fatigue inhabituelle, manque d'appetit, urines foncèes ou selles pâles. * Ces signes peuvent indiquer la prèsence de troubles sanguins ou hèpatiques.	Cessez de prendre APO-TERBINAFINE et avisez votre mèdecin **immèdiatement**. Ce dernier dècidera si vous devez ou non poursuivre le traitement.

D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent se manif ester chez certains patients. Si vous observez de tels effets, veuillez en faire part à votre médecin.

Consultez votre médecin si vous ne comprenez pas les directives ci-dessus ou si vous désirez obtenir de plus amples renseignements.

FABRICANT D'APO-TERBINAFINE

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston, Ontario
M9L 1T9

RAPPEL

Ce médicament vous a été prescrit à vous personnellement. N'en donnez à personne d'autre.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de conseils, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien.

203309

APOTEX INC.
SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE ENTIÈREMENT CANADIENNE